

Що означає Червона стрічка?



Червону
стрічку
носять
небайдужі!

Цей символ антиСНІДівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року (він помер від СНІДу через 3 роки).

Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини становить приблизно 12 років, однак сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

*Тільки спільними зусиллями
можна зупинити та
подолати ВІЛ/СНІД*

*1 грудня 2019 року відмічається
Всесвітній День боротьби зі СНІДом.
Його мета – привернути увагу
громадськості і нагадати суспільству,
що ВІЛ/СНІД є однією з самих
глобальних проблем людства.*

*За даними Всесвітньої організації
охорони здоров'я у світі з ВІЛ-
інфекцією живе близько 37 мільйонів
людей, серед яких 19,5 мільйонів
отримують антиретровірусне
лікування.*

*Україна залишається регіоном з
високим рівнем поширення ВІЛ. За
даними Об'єднаної програми
Організації Об'єднаних Націй із
ВІЛ/СНІД, близько 244 тисячі українців
мають ВІЛ, з них близько 100 тисяч не
знають про свою хворобу.*



*Станемо разом,
всією країною,
Боротися з
вірусом,
а не з людиною!!!
Щоб своєчасно
хворобу спинити,
Дати можливість
радісно жити!*

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом



• Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

Це обов'язково треба знати: 10 основних фактів, які молодь має знати про ВІЛ/СНІД

1. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини - ВІЛ, призводить до смертельної хвороби - синдрому набутого імунодефіциту людини (СНІД). ВІЛ та СНІД - невиліковні.
2. Людина, уражена вірусом, може виглядати здоровою і почуватися добре довгі роки, навіть, якщо вона є носієм вірусу.
3. Вірус може передаватися на всіх стадіях захворювання через кров, сперму, грудне молоко, овуляційні та вагінальні виділення.
4. Найчастіше ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом. Молоді дівчата особливо вразливі до ВІЛ при сексуальних контактах.
5. Молоді люди, які мають захворювання, що передаються статевим шляхом, також становлять групу високого ризику щодо ВІЛ-інфікування.
6. Найбільш уразливі молоді люди, які вживають наркотики ін'єкційно, або мають сексуальні контакти з ін'єкційними споживачами наркотиків. ВІЛ-інфекція може також передаватися через нестерильні інструменти при пірсингу, татуажі та інших маніпуляціях, в яких є контакт з кров'ю.
7. Ризик інфікування при статевих контактах зменшується, якщо партнери використовують презерватив. конфіденційним і має супроводжуватися до- та післятестовим консультуванням.

9. ВІЛ-інфекція не передається через обійми, потискання рук, користування туалетом, басейном, постільну білизну, кухонний посуд, укуси комах тощо.

10. Дискримінація людей, які живуть з ВІЛ - це порушення прав людини.

ВІЛ-інфекція передається від людини до людини:

- При використанні нестерильних голок чи шприців (тих, котрі вже були у використанні і заражені ВІЛ) для ін'єкцій;
- При переливанні інфікованої крові неінфікованій людині;
- При занятті незахищеним сексом;
- Від інфікованої матері до новонародженої дитини під час виношування плоду, при пологах чи годуючи дитину грудьми (*слід зазначити, що зараз існують ефективні препарати, що дозволяють запобігти передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Ці препарати доступні в Україні.*)

ВІЛ-інфекція не передається:

- Через чхання, кашель, при перебуванні в одному приміщенні з інфікованою людиною (вірус дуже нестійкий і гине поза організмом людини);
- Через укуси комах;
- Через домашніх тварин;
- При використанні домашнього посуду



В - "Вірус" - збудник захворювання.

І - "Імунодефіциту" - відсутність захисної реакції організму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу.

Л - "Людини".

С - "Синдром" - ряд симптомів, що вказують на наявність якоїсь хвороби чи стану.

Н - "Набутого" - такого, що набутий протягом життя, а не властивий від народження.

І - "Імунного" - стосується імунної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу.

Д - "Дефіциту" - у даному випадку відсутність захисної реакції імунної системи людини на наявність в

